

Exigences en matière de dépistage de l'hépatite C de l'État de New York

Qu'est-ce que l'hépatite C?

L'hépatite C est une maladie du foie. Elle peut entraîner de graves dommages au foie, le cancer du foie et la mort si elle n'est pas soignée. Cependant, les personnes atteintes de l'hépatite C peuvent être traitées et guéries avec des médicaments.

L'hépatite C se transmet principalement lors d'un contact avec le sang d'une personne infectée. Il est possible de contracter le virus en partageant des accessoires servant à injecter des drogues, à tatouer ou au perçage. L'hépatite C peut également être transmise d'une personne enceinte à son bébé pendant la grossesse.

Quelles sont les exigences de l'État de New York en matière de dépistage de l'hépatite C?

L'État de New York exige qu'un test de dépistage de l'hépatite C soit offert aux :

- personnes de 18 ans et plus;
- personnes présentant un risque et qui ont moins de 18 ans;
- personnes enceintes, à chaque grossesse.

Lorsqu'une personne accepte l'offre de dépistage de l'hépatite C et que le résultat est réactif ou positif, la ou le prestataire de soins de santé doit alors s'assurer d'effectuer le test de l'acide ribonucléique (ARN ou, en anglais, « RNA ») du virus de manière à diagnostiquer une infection par l'hépatite C.

Lorsque la personne soumise au test reçoit un diagnostic d'hépatite C, la ou le prestataire de soins de santé doit alors lui offrir des soins et traitements de suivi en lien avec le virus de l'hépatite C (VHC), ou encore aiguiller la personne vers une ou un responsable en soins de santé en mesure de le faire.

Pourquoi les personnes enceintes et les adultes doivent-ils se soumettre à un test de dépistage de l'hépatite C?

- Les nouveaux cas d'hépatite C sont à la hausse, particulièrement parmi les jeunes adultes et les personnes enceintes.
- La plupart des personnes atteintes de l'hépatite C ne présentent aucun symptôme et se sentent bien.
- Presque la moitié des personnes atteintes de l'hépatite C ignorent être infectées.
- Un test de dépistage est la première étape vers l'obtention de traitements de l'hépatite C qui mèneront éventuellement à une guérison.

À quel moment une personne de moins de 18 ans doit-elle se soumettre à un test de dépistage de l'hépatite C?

Les personnes de moins de 18 ans doivent se soumettre à un test de dépistage de l'hépatite C si elles :

- ont partagé des seringues ou tout autre accessoire servant à préparer et à injecter des drogues;
- se sont fait tatouer ou se sont fait faire un perçage par une ou un artiste sans permis, par exemple dans la rue ou durant un séjour en prison;
- ont reniflé des drogues;
- sont atteintes du VIH;
- ont été exposées au virus de l'hépatite C à la naissance;
- ont été exposées à du sang sur leur lieu de travail par le biais d'une piqûre d'aiguille ou d'une blessure causée par un objet pointu ou tranchant.

Comment le dépistage de l'hépatite C est-il effectué?

Le dépistage de l'hépatite C s'effectue en deux étapes. Une ou un prestataire de soins de santé peut effectuer les deux tests à partir d'un seul prélèvement sanguin.

La première étape consiste en un test de dépistage de l'hépatite C qui détecte la présence d'anticorps anti-VHC dans le sang. Ce test peut être effectué à partir d'un échantillon de sang envoyé dans un laboratoire ou par le biais d'une piqûre sur le doigt avec un test de détection rapide des anticorps anti-VHC.

- Un test d'anticorps non réactif ou négatif indique que la personne n'est pas infectée avec le virus de l'hépatite C. Cependant, si la personne a été récemment exposée au VHC, elle devra se soumettre à un test de dépistage supplémentaire.
- Un test réactif ou positif indique que des anticorps à l'hépatite C ont été détectés dans le sang. La personne peut être atteinte de l'hépatite C. Une personne qui a déjà eu ce virus portera toujours des anticorps dans son sang, et ce, même si elle a été traitée et qu'elle est guérie. Un test de suivi, soit le test d'ARN (« RNA ») de l'hépatite C, recherche le virus dans le sang de manière à pouvoir déterminer si la personne est atteinte ou non de l'hépatite C.

Pour obtenir davantage de renseignements sur le dépistage de l'hépatite C, visitez : <https://www.health.ny.gov/publications/1921.pdf>.

Comment traite-t-on l'hépatite C?

Des médicaments faciles à prendre permettent de guérir les personnes atteintes de l'hépatite C. Les médicaments pour traiter l'hépatite C sont tous oraux et doivent être pris pendant 8 à 12 semaines. Parfois, le traitement consiste à ne prendre qu'un comprimé par jour. La plupart des personnes ne présentent que quelques effets secondaires.

Pour obtenir davantage de renseignements concernant les traitements pour l'hépatite C, visitez : <https://www.health.ny.gov/publications/1923.pdf>.

Où est-il possible de trouver des tests de dépistage gratuits dans l'État de New York?

Pour trouver les emplacements offrant des tests de dépistage dans l'État de New York, visitez : https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/hepatitis/hepatitis_c/providers/testing_locations.htm.

Où peut-on trouver une ou un prestataire de soins de santé pour obtenir un traitement contre l'hépatite C dans l'État de New York?

L'annuaire électronique de l'Institut sur le sida du ministère de la Santé de l'État de New York (New York State Department of Health AIDS Institute) procure un accès facile et des renseignements à propos de tous les prestataires de soins de santé offrant des traitements contre l'hépatite C dans l'État de New York. Pour trouver une ou un prestataire de soins de santé traitant l'hépatite C, visitez : <https://providerdirectory.aidsinstituteny.org>.

Pour obtenir davantage de renseignements, visitez : www.health.ny.gov/hepatitisc

DÉPISTAGE DE L'HÉPATITE C :
Feuille d'information pour le consommateur • health.ny.gov/hepatitisc