

## Qui doit faire un dépistage du cancer du col de l'utérus et à quelle fréquence?

Toutes les femmes âgées de 21 à 65 ans, y compris celles qui ont été vaccinées contre le papillomavirus, doivent faire un dépistage du cancer du col de l'utérus.

- Les femmes âgées de 21 à 29 ans devraient avoir un frottis cervical tous les trois ans.
- Les femmes âgées de 30 à 65 ans peuvent choisir entre un frottis cervical tous les trois ans, un test HPV-HR tous les cinq ans, ou un frottis cervical et un test HPV-HR tous les cinq ans.

**Les femmes âgées de plus de 65 ans ou celles qui ont subi une ablation du col de l'utérus doivent consulter leur prestataire de soins de santé pour décider de ce qui leur convient le mieux.**

## Quels sont les symptômes du cancer du col de l'utérus?

Le cancer du col de l'utérus peut ne provoquer aucun symptôme au début, c'est pourquoi il est important de se faire dépister.

Certains symptômes du cancer du col de l'utérus peuvent comprendre :

- Saignements ou pertes vaginales abondants (plus que d'habitude)
- Saignements après les rapports sexuels, entre les règles ou après un examen pelvien
- Douleur pendant les rapports sexuels ou la miction

**Consultez votre prestataire de soins de santé si vous présentez ces symptômes.**

## Le saviez-vous?

- Le vaccin contre le papillomavirus peut prévenir la plupart des cancers du col de l'utérus et certains autres cancers.
- Utiliser des condoms pendant les rapports sexuels et ne pas fumer peuvent réduire le risque d'avoir un cancer du col de l'utérus.
- Les femmes doivent toujours consulter un professionnel de santé si les résultats du dépistage du cancer du col de l'utérus ne sont pas normaux.

## Vous n'avez pas d'assurance maladie?

Le New York State Department of Health Cancer Services Program (programme de services de prévention et de traitement du cancer du ministère de la Santé de l'État de New York, CSP) propose un dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus aux résidentes de l'État de New York admissibles et non assurées. Appelez au **1-866-442-CANCER (2262)** pour trouver un programme près de chez vous.

Pour obtenir des renseignements sur l'adhésion à un régime de soins de santé par l'intermédiaire de New York State of Health (Marché de l'assurance maladie de l'État de New York), appelez la ligne d'assistance téléphonique au **855.355.5777** ou consultez le site : [nystateofhealth.ny.gov](http://nystateofhealth.ny.gov).



Department  
of Health

# En savoir plus sur le cancer du col de l'utérus



**Le cancer du col de l'utérus peut être évité.**

**Un dépistage régulier peut aider à prévenir le cancer du col de l'utérus ou à le détecter à un stade précoce, lorsque le traitement est le plus efficace.**

**Les femmes âgées de 21 à 65 ans devraient parler à leur prestataire de soins de santé du dépistage du cancer du col de l'utérus.**



Cancer Services  
Program

## Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus?

Le cancer du col de l'utérus est un cancer qui se développe dans le col de l'utérus d'une femme. Le col de l'utérus est l'ouverture de l'utérus. Il relie l'utérus au vagin.

Le cancer du col de l'utérus commence généralement par des modifications des cellules du col de l'utérus. Si elles sont détectées à un stade précoce, ces cellules peuvent être enlevées pour prévenir le cancer.



## Quelles sont les causes du cancer du col de l'utérus?

La plupart des cancers du col de l'utérus sont causés par le papillomavirus humain (VPH). Le VPH est une infection transmissible sexuellement. Les hommes et les femmes peuvent contracter le VPH et les cancers causés par le VPH, comme le cancer du col de l'utérus, du vagin, du pénis, de l'anus et de la gorge.

Le vaccin contre le papillomavirus peut prévenir le VPH. Le vaccin contre le papillomavirus est conseillé chez les filles et les garçons âgés de 9 à 14 ans, et les jeunes adultes jusqu'à 26 ans.

## Quels sont les risques de cancer du col de l'utérus?

- **Avoir le papillomavirus.** Le papillomavirus est à l'origine de presque tous les cas de cancer du col de l'utérus.
- **Ne pas se faire dépister.** Le cancer du col de l'utérus est le plus souvent découvert chez des femmes qui n'ont jamais été dépistées.
- **Le tabagisme.** Les femmes qui fument ont environ deux fois plus de risques de développer un cancer du col de l'utérus que les non-fumeuses.
- **L'âge.** Les femmes de plus de 30 ans sont plus susceptibles d'avoir un cancer du col de l'utérus.



### Le risque de développer un cancer du col de l'utérus peut également être augmenté par les facteurs suivants :

- Avoir été traitée pour un cancer du col de l'utérus ou une dysplasie (cellules précancéreuses)
- Utiliser la pilule contraceptive pendant cinq ans ou plus
- Trois accouchements ou plus
- Avoir de nombreux partenaires sexuels
- Avoir le VIH ou une autre maladie qui empêche l'organisme de lutter contre les infections
- Avoir une mère qui a pris du DES (diéthylstilbestrol) pendant la grossesse



## Comment effectuer un dépistage du cancer du col de l'utérus?

Le dépistage consiste à déceler les signes de cancer avant la survenue de symptômes ou de problèmes.

Il existe deux tests de dépistage qui peuvent aider à prévenir le cancer du col de l'utérus ou à le détecter à un stade précoce :

### Le frottis cervical (ou test Pap)

Un frottis cervical (ou test Pap) recherche des changements dans les cellules prélevées sur le col de l'utérus.

### Le test HPV-HR (haut risque)

Le test HPV-HR recherche les types de papillomavirus responsables de la plupart des cancers du col de l'utérus. Ce test est généralement effectué en même temps que le frottis cervical.

**Si les résultats de votre dépistage ne sont pas normaux, consultez votre médecin.**

