


¿Se puede tratar el cáncer de próstata?

Existen muchas opciones para tratar el cáncer de próstata. Los hombres que fueron diagnosticados con cáncer de próstata deben hablar con su proveedor de atención médica para decidir si es necesario recibir tratamiento y qué opciones de tratamiento son las adecuadas para ellos.



¿No tiene seguro?

Si no está asegurado y necesita tratamiento para cáncer de próstata, el Programa para Tratamiento de Cáncer de Medicaid (MCTP, por sus siglas en inglés) podrá ayudarlo. El MCTP brinda cobertura completa de Medicaid por el tiempo que dure el tratamiento. Llame al **1-866-442-2262** para inscribirse en su área.



Obtenga información sobre el Cáncer de próstata



¿Sabía que...?

Uno de cada siete hombres padecerá cáncer de próstata durante su vida.

En el estado de Nueva York, los hombres negros tienen más probabilidades de morir por cáncer de próstata que los hombres blancos.

En los hombres del estado de Nueva York, el cáncer de próstata es la segunda causa principal de muerte relacionada con cáncer.

¿Necesita un seguro de salud? Puede obtener información sobre cómo inscribirse en un plan de salud a través de New York State of Health si llama a la línea de ayuda al **1-855-355-5777** o visita: nystateofhealth.ny.gov



Los hombres de entre 55 y 69 años de edad, los de raza negra y aquellos con antecedentes familiares de cáncer de próstata deberían hablar con sus proveedores de atención médica sobre un examen de detección de cáncer de próstata.


Juntos podrán decidir si la prueba de detección de cáncer de próstata es la opción adecuada para usted.



¿Qué es el cáncer de próstata?

El cáncer de próstata es un tipo de cáncer que comienza en la próstata. Esta es la segunda causa de cáncer más común entre los hombres del estado de Nueva York.

El cáncer de próstata es una enfermedad grave, pero la mayoría de los tipos de cáncer de próstata es de lento crecimiento. De hecho, la mayoría de los hombres con cáncer de próstata tiene más de 65 años de edad, y no muere por la enfermedad.



La próstata es una pequeña glándula que solo tienen los hombres. La próstata se agranda a medida que los hombres envejecen.

Cuando un hombre tiene cáncer de próstata u otros problemas de próstata, esto le ocasiona problemas para orinar y para eyacular.

¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de próstata?

- **La edad.** A medida que los hombres envejecen, aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata. Alrededor de 6 de cada 10 tipos de cáncer de próstata se detectan en hombres mayores de 65 años.
- **La raza.** Los hombres negros tienen una y media veces más probabilidades de padecer cáncer de próstata que los hombres blancos.
- **Historial familiar.** Tienen más riesgo los hombres cuyo padre, hermano o hijo tuvo cáncer de próstata.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de próstata?

Algunos hombres no presentan ningún síntoma, especialmente durante las primeras etapas del cáncer de próstata. Si se presentan síntomas, estos pueden incluir los siguientes:

- Problemas para orinar, como dolor o ardor, problemas para comenzar o terminar de orinar o flujo débil.
- Micción frecuente, especialmente durante la noche.
- Sangre en la orina o en el semen.
- Dolor de espalda, caderas o pelvis que no desaparece.
- Dolor al eyacular.

Si tiene cualquiera de estos síntomas, hable con su proveedor de atención médica.

¿Quién debería someterse a una prueba de detección de cáncer de próstata?

La prueba de detección se hace para detectar cáncer antes de que la persona presente algún síntoma. Esto puede ayudar a detectar el cáncer en sus primeras etapas.

Los hombres de entre 55 y 69 años de edad, los de raza negra y aquellos con antecedentes familiares de cáncer de próstata deberían consultar a su proveedor de atención médica sobre sus riesgos personales de padecer cáncer de próstata y si el examen de detección es la mejor opción para ellos.

Las pruebas de detección de cáncer de próstata no son recomendables para todos los hombres. Esto se debe a que la mayoría de los tipos de cáncer de próstata crece lentamente y no causa la muerte. La detección podría conducir a tratamientos innecesarios que pueden presentar efectos secundarios, como impotencia e incontinencia.

El examen de detección no se recomienda a hombres de 70 años o más.

¿Qué es el Examen de Detección de Cáncer de Próstata?

La prueba de antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés) mide la cantidad de antígeno prostático en la sangre de un hombre.

Un nivel de PSA mayor de lo normal podría significar que hay problema de próstata, como próstata agrandada. Tener nivel alto de PSA no necesariamente significa que tiene cáncer de próstata.

Tener resultados positivos en PSA puede implicar que tiene que realizarse otras pruebas, incluso una biopsia. **El cáncer solo se puede diagnosticar con una biopsia.**

La mayoría de los planes de seguro de salud tienen la obligación de cubrir el examen de detección de cáncer de próstata sin gastos de bolsillo.