

Emergency Response for Opioid Overdose



nasal naloxone



harm reduction
COALITION



Try to wake the person up

- Shake them and shout.
- If no response, grind your knuckles into their breast bone for 5 to 10 seconds.






Someone has
overdosed.

Someone isn't
breathing.



Call 911

If you report an overdose,
New York State law protects
you and the overdosed person
from being charged with drug
possession, even if drugs
were shared.



Administer nasal naloxone


- Hold sprayer between thumb and two fingers.
- **DO NOT TEST SPRAY.** Spray entire dose into nostril.
- Repeat after 2 to 3 minutes if still not conscious.



Check for breathing

Give CPR if you have been trained, or do rescue breathing:

- Tilt the head back, open the mouth, and pinch the nose.
- Start with 2 breaths into the mouth. Then 1 breath every 5 seconds.
- Continue until help arrives.



Stay with the person

- Naloxone wears off in 30 to 90 minutes.
- When the person wakes up, explain what happened.
- If you need to leave, turn the person on his or her side to prevent choking.

To get help:

**New York State Office of Alcoholism
and Substance Abuse Services
(OASAS)**

(877) 8-HOPE-NY, or (877) 846-7369

www.oasas.ny.gov

To get a replacement kit:

Directory of programs

www.health.ny.gov/overdose

For more information:

Harm Reduction Coalition

harmreduction.org/overdose

Respuesta a Emergencia por Sobredosis



“naloxone” por vía nasal




harm reduction
COALITION



Ver si la persona responde


- Sacuda a la persona y h ablele en voz alta (gr itale) para despertarla.
- Si no responde, frota tus nudillos en su pecho por 5 a 10 segundos.





Llame al 911

Si usted reporta una sobredosis la ley en el estado de Nueva York lo protege a usted y a la persona que sufrió la sobredosis de ser acusado por posesión de drogas, aún si las ha compartido.



Administre el “naloxone” por vía nasal



- Sostenga el atomizador entre el dedo pulgar y los próximos dos dedos
- **NO PRUEBE EL ATOMIZADOR.**
- Rocíe la dosis entera en la fosa nasal.
- Repita el paso anterior después de pasar dos o tres minutos, si la persona no está consciente.



Vea si la persona no está respirando

Administre Reanimación Cardiopulmonar (“CPR”), si ha sido adiestrado, o respiración asistida

- Incline la cabeza de la persona hacia atrás, levántele la barbilla y apriétele la nariz.
- Sople aire dos veces en la boca de la persona. Continúe con un sople de aire cada 5 segundos. úe hasta que llegue ayuda.



Permanezca con la persona

- El efecto del “naloxone” desaparece dentro de 30 a 90 minutos.
- Cuando la persona despierte, explíquele lo que ha pasado.
- Coloque a la persona en su costado (de lado) para prevenir que pueda ahogarse o afixiarse.

Para ayuda:

**New York State Office of Alcoholism
and Substance Abuse Services (OASAS)**

(877) 8-HOPE-NY, or (877) 846-7369
www.oasas.ny.gov

Para conseguir un “kit” de reemplazo:

Directorio de programas
www.health.ny.gov/overdose

Para más información:

Harm Reduction Coalition
harmreduction.org/overdose