

药房紧急接触后预防人  
类免疫缺陷病毒 (HIV)  
感染的措施

## 药房紧急接触后预防人类 免疫缺陷病毒 (HIV) 感染 的措施

如果您生活在纽约市，还有其他  
低价获取 PEP 的方法。访问  
NYC 健康地图：  
[https://a816-healthpsi.nyc.gov/  
NYHealthMap](https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYHealthMap).

# 预防 HIV 的 PEP 措施

如需查找提供这些服务的地点，  
请从左边的服务菜单中选择：

- 性健康服务
- PrEP 和 PEP
- 无保险人士的滑动费率
- 为无保险人士提供的免费 PEP

# 预防 HIV 的 PEP 措施中的 4 个要点

1.

如果您与 HIV 感染者或 HIV 感染状况不详的人发生性行为或共用针头；

2.

接触发生在过去 72 小时内；

3.

该药房中有接受过培训的药剂师；

4.

您可以开始使用药物来预防感染 HIV。

## 鉴于必须尽快开始 PEP，药房则是个不错的选择，因为：

- 附近通常有药房，并且营业时间较长；
- 药房有现有的 PEP 药物；
- 药剂师都是接受过培训的爱心人士，他们会以私密方式为您提供帮助；
- 如果您担心保密问题，可以要求私下和药剂师交谈。

尽快服用 PEP 药物并且持续服用 28 天，PEP 则会起到预防 HIV 的作用。

- 药剂师可以让您开始用药，并为您提供 7 天的药量；
- 药剂师会说明去卫生保健提供者处就诊的重要性；
- 您可以在您的常规卫生保健提供者处就诊（如有），或者药剂师可以为您预约一名卫生保健提供者。

如果您决定在药房开始 PEP，药剂师将在 1-3 天内尽快为您预约卫生保健提供者。

卫生保健提供者将：

1. 评估您接触 HIV 的情况；
2. 为您提供 HIV 检测；
3. 决定给您开一个处方，以便您在 HIV PEP 的完整 28 天周期内可继续用药；
4. 评估您可能接触乙型和丙型肝炎的情况，并根据需要进行处理；
5. 建议您按医嘱服用所有药物。

## 了解接触前预防 (PrEP)

如果您在以往接触中成功地使用了 PEP，并且您希望自己今后不会感染 HIV，您可以考虑接触前预防 (PrEP)。如果 HIV 检测结果表明您没有感染 HIV，则对您而言，PrEP 是一个预防选择。

向卫生保健提供者咨询 PrEP 的信息：

- 访问纽约市性健康诊所的网站（针对纽约州居民）：  
<https://a816-healthpsi.nyc.gov/NYCSiteLocator>
- 查看纽约市和整个州内提供的纽约州 PrEP 提供者名录：  
[www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/](http://www.health.ny.gov/diseases/aids/general/prep/)