

¿Cómo podría contagiarme?

Puedes contagiarte si tienes **relaciones sexuales sin protección** con una pareja infectada.

Las mujeres infectadas que quedan embarazadas pueden contagiar al feto.

3830 Spanish 9/04

(Adaptamos con la sífilis, por sus siglas en inglés)

SOS
Adaptado con el permiso de SOS

1-800-227-8922

o llama a la línea directa nacional de ETS (enfermedades de transmisión sexual) de los CDC (centros para el control y la prevención de enfermedades):

(518) 474-3598

Si tienes preguntas o si necesitas más información comunícate con el departamento de salud local. O llama al Departamento de Salud del Estado de Nueva York:

No discrimina.

Sífilis

Hazte el análisis. Hazte tratar.

¿Qué es la sífilis?

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que, si no es tratada, puede causar daño en el cerebro, el corazón, los ojos y otras partes del cuerpo.

¿Qué debería buscar?

Unas pocas semanas después de la exposición

- llagas pequeñas, indoloras, en o alrededor de los genitales, el recto o la boca, que se curan en un mes como máximo.

Alrededor de 6 semanas más tarde

- erupción en las manos o en los pies,
- llagas en o dentro de la boca y la lengua,
- llagas que parecen verrugas en o alrededor del área genital,
- fiebre, dolor de cabeza, cansancio, glándulas inflamadas, cabello debilitado y dolor de garganta.

Algunas personas no presentan síntomas, pero pueden obtener un diagnóstico mediante un simple análisis de sangre. La sífilis puede ser tratada con medicación y es curable si se la detecta en las primeras etapas de la infección.

Para prevenir la sífilis:

- practicar abstinencia (no tener relaciones sexuales), o
- si mantienes relaciones sexuales, utilizar un condón o protector bucal de látex.