



Czego można spodziewać się po zaszczepieniu dziecka przeciw COVID-19 (dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat)

Zaszczepienie dzieci przeciwko COVID-19 może sprawić, że:

- Nie zachorują na COVID-19.
- Nie będą przechodzić choroby COVID-19 zbyt ciężko, jeśli na nią zachorują.
- Będą bezpieczne, chodząc do szkoły lub przedszkola.
- Będą bezpieczne podczas uprawiania sportu, zabaw i innych zajęć grupowych.

Informacje ogólne

Po szczepieniu przeciw COVID-19 organizm Twojego dziecka zacznie wytwarzać przeciwciała i przygotowywać je w inny sposób, aby chronić je przed wirusem COVID-19. Jest to tak zwana odpowiedź immunologiczna. Szczepionka NIE zawiera wirusa wywołującego zakażenie COVID-19.

Podobnie jak w przypadku innych szczepionek dla dzieci, większość dzieci czuje się dobrze po otrzymaniu szczepionki przeciw COVID-19. Niektóre dzieci mogą czuć się trochę osłabione. Zwykle jest to znak, że szczepionka zaczyna działać.

Oto najczęściej występujące skutki uboczne po otrzymaniu szczepionki przez dzieci:



Co należy robić po szczepieniu

Po szczepieniu przeciwko COVID-19 zapewnij dziecku dużo miłości i uwagi. Większość skutków ubocznych szczepionek jest zwykle łagodna i krótkotrwała. Jeśli Twoje dziecko odczuwa skutki uboczne, możesz zrobić kilka rzeczy, które pomogą mu poczuć się lepiej.

Jeśli w miejscu wstrzyknięcia pojawi się ból po wykonaniu zastrzyku:

- Przyłóż zimny okład owinięty ręcznikiem lub wilgotną ściereczką na bolące miejsce na maksymalnie 20 minut lub w razie potrzeby.
- Zachęć dziecko do poruszania ramieniem lub nogą, aby zmniejszyć ból i opuchliznę. W przypadku niemowląt możesz delikatnie poruszać ich nogą.

- Podaj dziecku środek przeciwbólowy bez aspiryny, na przykład ibuprofen lub acetaminofen. Skontaktuj się z pediatrą lub farmaceutą, jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii dawkowania.

Jeśli Twoje dziecko ma gorączkę:

- Podawaj dziecku dużo płynów, zwłaszcza wody.
- Podaj dziecku środek przeciwbólowy bez aspiryny, na przykład ibuprofen lub acetaminofen. Skontaktuj się z pediatrą lub farmaceutą, jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii dawkowania.

Specjalne informacje na temat niemowląt i małych dzieci

Niemowlęta i małe dzieci mogą nie być w stanie powiedzieć, jak się czują, dlatego też ważne jest, aby zwracać na nie szczególną uwagę przez kilka dni po szczepieniu. Mogą wydawać się grymasne, więcej płakać lub nie jeść tyle co zwykle. Niektóre dzieci mogą jeść mniej w ciągu 24 godzin po szczepieniu.

Te dodatkowe kroki mogą być pomocne po szczepieniu:

- Nakarm dziecko piersią po szczepieniu, jeśli nadal karmisz piersią.
- Od czasu do czasu delikatnie poruszaj nogą niemowlęcia w miejscu, w którym otrzymało zastrzyk.
- W przypadku niemowląt umieść zimną, wilgotną ściereczkę w miejscu wstrzyknięcia, aby zmniejszyć ból i obrzęk.
- W przypadku gorączki pomoc może przemyć dziecka chłodną gąbką.

Ciężkie reakcje na szczepionkę przeciw COVID-19 są rzadkie. Ważne jest jednak, aby wiedzieć, kiedy należy szukać pomocy medycznej.

Skontaktuj się z pediatrą

- Jeśli skutki uboczne są niepokojące lub nie ustępują po kilku dniach.
- Jeśli po szczepieniu u dziecka wystąpi wysoka gorączka (104°F (40°C) lub wyższa) albo osłabienie.
- Jeśli zauważysz coś, co Cię zaniepokoi.

Monitorowanie i dalsze działania

- Zachowaj kartę szczepionki z pierwszego zastrzyku i przynieś ją na następną wizytę.
- Jeśli Twoje dziecko jest w wieku od 6 miesięcy do 4 lat, zaleca się podanie 2 dawek szczepionki Moderna lub 3 dawek szczepionki Pfizer-BioNTech, aby zagwarantować pełną ochronę przed COVID-19.
- Jeśli Twoje dziecko ma obniżoną odporność (osłabiony układ odpornościowy), wymagane są dodatkowe dawki.
- Zanotuj datę następnej wizyty dziecka w sprawie szczepienia, aby upewnić się, że będzie w pełni zaszczepione i chronione.

W celu uzyskania dodatkowych informacji odwiedź następujące strony:

- <https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/before-during-after-shots.html>
- <https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html>
- <https://covid19vaccine.health.ny.gov/combating-misinformation-about-covid-19-vaccines>

