



## Чего следует ожидать после вакцинации ребенка против COVID-19 (возраст от 6 мес до 4 лет)

Вакцинация ребенка от COVID-19 может помочь:


- Защитить его от заболевания COVID-19.
- Защитить его от тяжелого течения COVID-19.
- Обеспечить ему безопасность при посещении школы или детского сада.
- Обеспечить ему безопасность во время занятий спортом, игр и других групповых занятий.

### Общая информация

После получения вакцины против COVID-19 организм вашего ребенка начнет вырабатывать антитела и другими способами готовиться к защите от вируса, вызывающего COVID-19. Это называют иммунным ответом. Вакцина НЕ содержит вирус, который вызывает заболевание COVID-19.

Как и в случае с другими детскими вакцинами, после вакцинации против COVID-19 большинство детей будут чувствовать себя хорошо. Некоторые дети могут чувствовать легкое недомогание. Обычно оно указывает на начало действия вакцины.

Ниже приведены наиболее распространенные общие побочные эффекты вакцинации у детей:



### Что делать после вакцинации

После прививки от COVID-19 окружите ребенка заботой и проявляйте внимание к его самочувствию. Большинство побочных эффектов вакцинации кратковременные и легко переносятся. Если у вашего ребенка наблюдаются побочные эффекты, для улучшения его самочувствия вы можете принять следующие меры.

Если после прививки болит место инъекции:

- Приложите холодный компресс, завернутый в полотенце или влажную салфетку для купания, к больному месту минут на 20 или по мере необходимости.
- Просите ребенка больше двигать рукой или ногой, чтобы ослабить боль и снизить отечность. Ухаживая за младенцем, вы можете сами аккуратно подвигать его ногу.

продолжение на следующей странице →

- Дайте ребенку обезболивающее, не содержащее аспирина, например, ибупрофен или ацетаминофен. Уточните дозировку у своего педиатра или фармацевта.

Если у вашего ребенка жар:

- Давайте ему пить, в частности воду, в больших количествах.
- Дайте ребенку обезболивающее, не содержащее аспирина, например, ибупрофен или ацетаминофен. Уточните дозировку у своего педиатра или фармацевта.

## Специальная информация о детях грудного и ясельного возраста

Дети грудного и ясельного возраста могут не могут рассказать вам о своем самочувствии, поэтому в течение нескольких дней после вакцинации необходимо уделять им особое внимание. Они могут казаться капризными, больше плакать или меньше есть. В течение суток после прививки некоторые дети могут меньше есть.

Следующие дополнительные шаги могут быть полезны после вакцинации:

- После прививки кормите ребенка грудью, если он на грудном вскармливании.
- Время от времени аккуратно двигайте ногу младенца, в которую была сделана инъекция.
- Младенцам: приложите к месту инъекции холодную влажную салфетку для купания, чтобы уменьшить боль и отек.
- Прохладная ванна с губкой может помочь ослабить жар.

Тяжелые реакции на вакцину против COVID-19 проявляются редко. Однако важно знать, когда следует обращаться за медицинской помощью.

## Обратитесь к педиатру

- Если у вас вызывают беспокойство побочные эффекты, или если вам кажется, что через несколько дней они не проходят.
- Если у вашего ребенка сильный жар (от 104° F (40° C)) или слабость после вакцинации.
- Если любые замеченные вами нарушения особенности вызывают у вас беспокойство.

## Медицинские записи и последующие действия

- Сохраните карточку вакцинации, полученную при первой прививке, и принесите ее на следующий прием.
- Если возраст ребенка от 6 месяцев до 4 лет, для полной защиты от COVID-19 рекомендуется сделать 2 прививки Moderna или 3 прививки Pfizer-BioNTech.
- Если у вашего ребенка иммунодефицит (ослабленная иммунная система), требуются дополнительные дозы.
- Запишите дату следующей вакцинации вашего ребенка, чтобы обеспечить ему получение полной схемы вакцинации для полной иммунной защиты.

## Дополнительная информация:



- <https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/before-during-after-shots.html>
- <https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html>
- <https://covid19vaccine.health.ny.gov/combating-misinformation-about-covid-19-vaccines>