



Qué esperar después de que su hijo recibe la vacuna del COVID-19 (6 meses a 4 años)

Vacunar a los niños contra el COVID-19 puede ayudarlos a:

- Evitar que se contagien del COVID-19.
- Que se enfermen gravemente si se contagian del COVID-19.
- Mantenerlos seguros cuando vayan a la escuela o a la guardería.
- Mantenerlos seguros mientras participan en deportes, juegos y otras actividades en grupo.

Información general

Después de la vacuna del COVID-19, el cuerpo de su hijo comenzará a crear anticuerpos y a preparar su cuerpo en otras maneras para protegerlo contra el virus del COVID-19. Esto se llama respuesta inmunológica. La vacuna NO contiene el virus que causa la infección por COVID-19.

Al igual que con otras vacunas infantiles, muchos niños se sentirán bien después que reciban la vacuna del COVID-19. Algunos pueden sentirse un poco “enfermos”. Generalmente, esto suele ser una señal de que la vacuna está empezando a funcionar.

Estos son los efectos secundarios más frecuentes en los niños:



Qué hacer después de la inyección

Asegúrese de darle a su hijo mucho amor y atención después de la vacuna del COVID-19. Muchos de los efectos secundarios de las vacunas son generalmente breves y leves. Si su hijo tiene efectos secundarios, hay cosas que puede hacer para que se sienta mejor.

Si el lugar de la inyección está adolorido después de la inyección:

- Ponga una compresa fría envuelta en una toallita húmeda en el área adolorida por hasta 20 minutos, o según sea necesario.
- Anímelos a mover el brazo o la pierna para aliviar el dolor y la hinchazón. En el caso de los bebés, puede moverles la pierna suavemente.

- Deles un analgésico que no sea aspirina, como ibuprofeno o acetaminofeno. Consulte a su pediatra o farmacéutico si necesita ayuda con la dosis.

Si su hijo tiene fiebre:

- Deles muchos líquidos, especialmente agua.
- Deles un analgésico que no sea aspirina, como ibuprofeno o acetaminofeno. Consulte a su pediatra o farmacéutico si necesita ayuda con la dosis.

Información especial para bebés y niños pequeños

Es posible que los bebés y los niños pequeños no puedan decirle cómo se sienten; así que es importante ponerles más atención por unos días después de la vacuna. Puede ser que se muestren quisquillosos, que lloren más o no coman mucho. Algunos niños pueden comer menos en las 24 horas después de la inyección.

Estos consejos complementarios pueden ser de ayuda después de la vacuna:

- Amamante al bebé después de la inyección, si todavía está amamantando.
- Mueva la pierna del bebé donde recibió la inyección, suavemente, de vez en cuando.
- Para los bebés, coloque un paño húmedo y frío en el lugar de la inyección para reducir el dolor y la hinchazón.
- En caso de fiebre, un baño de esponja frío puede calmarlos.

Las reacciones a la vacuna del COVID-19 son poco frecuentes. Sin embargo, es importante saber cuándo buscar atención médica.

Comuníquese con su pediatra

- Si los efectos secundarios son preocupantes o no parecen desaparecer después de unos días.
- Si su hijo tiene fiebre alta (104° F [40° C] o más alta) o debilidad después de la vacuna.
- Si ve algo que lo preocupa.

Expediente y seguimiento

- Guarde la tarjeta de la vacuna de su primera inyección y tráigala para su próxima cita.
- Si su hijo está entre las edades de 6 meses a 4 años, las recomendaciones son que reciba, ya sea 2 inyecciones de Moderna o 3 inyecciones de Pfizer-BioNTech, para que esté completamente protegido del COVID-19.
- Si su hijo esta inmunodeprimido (tiene un sistema inmunológico débil) se necesitan más dosis.
- Tome nota de la próxima cita de vacunación para asegurarse que tienen todas las vacunas y que están completamente protegidos.

Para obtener más información:



- <https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/before-during-after-shots.html>
- <https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html>
- <https://covid19vaccine.health.ny.gov/combating-misinformation-about-covid-19-vaccines>