

请向您的医疗服务提供者咨询结肠癌筛查以及您如何进行 FIT (粪便免疫化学测试) 测试的事项。



Cancer Services Program

您是否已年满 50 岁?

是否曾做过结肠癌测试?

未参加保险?
年龄在 50 岁或以上?
请致电 1-866-442-2262

了解您如何就近获得免费结肠癌测试。



Department of Health

关注我们:

health.ny.gov [facebook.com/nysdoh](https://www.facebook.com/nysdoh)
twitter.com/HealthNYGov [youtube.com/nysdoh](https://www.youtube.com/nysdoh)

本手册由 Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 疾病控制与预防中心) 的 Grant/Cooperative Agreement (补助金/合作协议) NU58DP006102 支持, 其内容由 NYSDOH 完全负责, 但这并不代表 CDC 的官方立场。

进行结肠癌
测试变得更
加容易!

请仔细阅读, 了解更多关于
FIT (一种新结肠癌测试)
的信息。

进行 FIT 测试

您知道吗？

- 结肠直肠癌（结肠癌和直肠癌）是导致癌症死亡的第二大原因。
- 筛查检测可以在结肠息肉癌变之前发现息肉，进而帮助预防结肠癌。（息肉是良性组织，但如果未及时发现，则可能癌变。）
- 建议的筛查检测包括粪便测试、结肠镜筛查、乙状结肠镜检查检查和钡灌肠检查。
- 如果能较早发现和治疗，结肠癌是可以治愈的。

哪些人需要进行结肠癌筛查检测？

- 大部分人应在 50 岁时开始结肠癌筛查检测。
- 如果您或家庭成员有结肠癌或结肠息肉，则您可能需要尽早进行结肠癌筛查。

什么是 FIT？

- FIT 的全称是 Fecal Immunochemical Test (fee-kuhl-im-you-no-KIM-uh-kuhl)。
- FIT 是一种针对结肠癌的、可带回家的粪便筛查测试。
- FIT 可以检查您的粪便（排便）中是否潜血。

为何要进行 FIT？

- 测试简单易于操作。
- 可在家里进行，保护隐私。
- 无需特别改变饮食或药物。

我应该多久做一次 FIT？

- 如果您的测试结果呈阴性，则应每年进行一次 FIT 测试。

如果我的测试结果呈阳性，该怎么办？

- 如果测试结果呈阳性，则需进行结肠镜筛查，确定是否有癌变、息肉或其他流血缘由。
- 如果能较早发现和治疗，结肠癌是可以治愈的。
- 发现并切除息肉后，可有效预防结肠癌。

您知道吗？